

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription

PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
 Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
 LUCCIANA - 20290 BORGIO -

☎ (95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 31
 du 15 Mai 1984.

Temps frais, précipitations fréquentes, le climat de ces 10 derniers jours a freiné le développement de la vigne et n'a souvent pas permis la réalisation des traitements.

V I G N E

* **OIDIUM** : de nombreuses taches.

Surveillez les parcelles atteintes en 1983 et les cépages sensibles. Renouvelez le traitement si nécessaire.

* **MILDIOU** : soyez très vigilants.

Si le premier traitement dans les secteurs habituellement touchés n'a pu être fait, réalisez-le dès maintenant. Dans les autres secteurs, soyez vigilants : des contaminations primaires sont possibles dès que la température va s'élever. N'hésitez pas à nous envoyer des feuilles.

N'oubliez pas :

- les fongicides à base de captafol, folpel, captane, carbatène, cuivre, dichlofluanide, dithianon, mancooper, mancozèbe, manèbe, métirame de zinc, propinèbe, zinèbe, ont une action préventive. Ils restent en surface et sont lessivés si la quantité de pluie dépasse 20 mm.

- les fongicides à base de cymoxanil (Syphal, Cuprofix, Sygan, Antéor, Fulvax, Rémitline, Aviso, Diamétan, Novofix ...) sont pénétrants. Ils ne protègent pas les organes formés après le traitement.

- les fongicides à base de phoséthyl-al (Mikal, Rhodax) et métalaxyl (Acylon Super F), ofurace (Caltan, Caltan C, Vamin) sont transportés par la sève.

Ne pas dépasser 2 à 3 applications pendant la saison, avec ces produits (Caltan, Caltan C, Vamin).

* **Botrytis sur feuilles** : quelques cas.

Ils ont été observés en MARANA, BRAVONE, ALERIA, ainsi qu'à AJACCIO. Dans ce cas, utiliser un produit à base de folpel.

P12


... / ...

*** ACARIENS JAUNES ET ROUGES :**

Les populations sont souvent nombreuses. N'intervenez que si 70 % des feuilles sont occupées avec les produits cités dans le Bulletin N° 30.

*** CICADELLES VERTES :**

Elles s'envolent si on secoue le feuillage. Elles sont nombreuses sur la Plaine Orientale, à PATRIMONIO et dans la Plaine de PERI. Si celles-ci sont observées seules, une intervention ne se justifie que lorsque le seuil de 100 larves pour 100 feuilles est atteint.



*** VERS DE LA GRAPPE :**

Le premier vol de tordeuses est en diminution. Quelques pontes ont été observées dans la région de PIANICCIA, ALERIA. Aucune sortie de chenilles n'est visible. Ne pas intervenir pour le moment. Attendre notre prochain Bulletin.

ARBRES FRUITIERS

*** CORYNEUM DU CERISIER :**

Se manifeste par des taches délimitées de couleur brun rouge qui se détachent ensuite. La feuille apparaît percée de trous. Effectuer des pulvérisations à base de captane, thirame, zirame.

*** CLOQUE DU PECHER :**

Renouveler le traitement.

*** PUCERONS ET ACARIENS SUR POMMIERS ET PECHER :**

Toujours nombreux. Intervenir avec les produits du Bulletin N° 30.

*** PLOMB à STEREUM :**

Cette maladie est de plus en plus fréquente dans notre région. Pour éviter sa transmission d'un arbre à l'autre, il faut désinfecter les outils de taille et cela même si la maladie n'est pas encore visible dans vos plantations. Effectuer une pulvérisation fongicide à base de benomyl, carbendazime, thirame, après la taille en vert ainsi qu'après les éclaircissements.

*** MONILIA SUR PRUNES :**

Les conditions climatiques étant favorables, il faut envisager un traitement préventif avec des fongicides à base de benomyl, carbendazime, méthylthiophanate ou thirame.



Coryneum